

StemEnhance
SE²

Medicinal Ingredients:

Each capsule contains

550 mg

Aphanizomenon flos-aquae

(*Aphanizomenon flos-aquae*)

(Whole cell, fresh; 38.202:1 extract)

Ophiocordyceps sinensis

(Cordyceps) (Hyphae)

Fucoidan (Fucoidan)

(*Undaria pinnatifida* Sporophyll)

Fallopia multiflora

(Prepared Fleeceflower Root) (Root)

Non-medicinal Ingredients: hypromellose, silica

Ingrédients médicinaux:

Each capsule contains

550 mg

Aphanizomenon flos-aquae

(*Aphanizomenon flos-aquae*)

(Cellule entière, frais; 38.202:1 extrait;

1,02 µg vitamine B12,

6,44 µg Vitamine K1)

Ophiocordyceps sinensis

(Cordyceps) (Hyphae)

Fucoidan (Fucoidan)

(*Undaria pinnatifida* sporophylle)

Fallopia multiflora

(racine de renouée préparée) (racine)

Ingrédients non médicinaux : hypromellose, silice

Dose (Adults): Take 1 capsule 3 times daily. Do not take within an hour of other medications. Consult a health care practitioner for use beyond 2 months.

Keep in a cool dry place. Do not refrigerate. May contain Soy.

Posologie (adultes) : Prendre 1 capsule 3 fois par jour. Ne pas prendre dans l'heure suivant la prise d'autres médicaments. Consulter un professionnel de santé si vous poursuivez l'utilisation au-delà de 2 mois.

Conserver dans un endroit frais et sec. Ne pas réfrigérer. Peut contenir des traces de soja

RISK INFORMATION: CONSULT A HEALTH CARE PRACTITIONER PRIOR TO USE IF YOU ARE TAKING BLOOD THINNERS OR LAXATIVES. DO NOT TAKE IF YOU ARE PREGNANT OR NURSING; HAVE DIARRHEA, ACUTE INTESTINAL INFLAMMATION OR OBSTRUCTION, ULCER, ABDOMINAL PAIN OF UNKNOWN ORIGIN, NAUSEA AND/OR VOMITING. HEADACHE OR A CHANGE IN BOWEL MOVEMENT MAY OCCUR; REDUCE DOSAGE OR STOP TAKING IF SYMPTOMS PERSIST. HYPERSENSITIVITY/ALLERGIC REACTIONS ARE KNOWN TO OCCUR; IN WHICH CASE DISCONTINUE USE. KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN AND PETS. DO NOT PURCHASE IF SAFETY SEAL IS BROKEN.

RENSEIGNEMENTS SUR LES RISQUES : CONSULTER UN PROFESSIONNEL DE SOINS DE SANTÉ AVANT D'UTILISER SI VOUS PRENEZ DES ANTICOAGULANTS OU DES LAXATIFS. NE PAS PRENDRE SI VOUS ÊTES ENCEINTE OU SI VOUS ALLAITEZ; SI VOUS AVEZ LA DIARRHÉE, UNE INFLAMMATION AIGUË OU UNE OBSTRUCTION INTESTINALE, UN ULCÈRE, DES DOULEURS ABDOMINALES D'ORIGINE INCONNUE, DES NAUSÉES OU VOMISSEMENTS. DES MAUX DE TÊTE OU DES CHANGEMENTS DE SELLES PEUVENT SURVENIR; RÉDUIRE LA DOSE OU CESSER DE PRENDRE SI LES SYMPTÔMES PERSISTENT. ON SAIT QUE DES RÉACTIONS D'HYPERSENSIBILITÉ/ALLERGIQUES PEUVENT SE PRODUIRE; DANS CE CAS, CESSER L'UTILISATION. GARDER HORS DE PORTÉE DES ENFANTS ET DES ANIMAUX. NE PAS ACHETER SI LE SCEAU DE SÉCURITÉ EST BRISÉ.